

Нормативные показатели качества

Внешний вид, цвет	однородная эмульсия белого или бледно-розового цвета, допускается отслоение масла в верхней части флакона.
Наличие посторонней примеси, трещин флаконов	не допускается
Стерильность	должна быть стерильна
Стабильность эмульсии	высота верхней прозрачной фракции не более 10 мм
Вязкость (мм²/с²)	не более 200
Полнота инактивации	вирусы, входящие в состав вакцины, должны быть полностью инаktivированы
Безвредность	должна быть безвредной
Антигенная активность через 28 сут. после иммунизации:	не менее чем у 80% привитых цыплят
Антигенная активность: титр антител к вирусу НБ в РТГА, не ниже	5,0 log ₂ (1:32)
Антигенная активность: титр антител к вирусу НБ в ИФА, не ниже	2-х минимальных положительных значений
Антигенная активность: титр антител к вирусу ИБК - индекс нейтрализации вируса ИБК со сборной сывороткой крови от вакцинированных цыплят, выше	на 2,0 lg ЭИД ₅₀ , чем в контроле
Антигенная активность: титр антител к вирусу ИБК - индекс нейтрализации вируса ИБК со сборной сывороткой крови от вакцинированных цыплят, в ИФА, не ниже	2-х минимальных положительных значений
Антигенная активность через 28 сут. после иммунизации: титр антител к вирусу НБ не менее чем у	5,0 log ₂ (1:32)

<p>80% привитых цыплят в РТГА, не ниже</p>	
<p>Антигенная активность через 28 сут. после иммунизации: титр антител к вирусу НБ не менее чем у 80% привитых цыплят в ИФА, не ниже</p>	<p>2-х минимальных положительных значений</p>
<p>Антигенная активность через 28 сут. после иммунизации: титр антител к вирусу ИБК - индекс нейтрализации вируса ИБК со сборной сывороткой крови от вакцинированных цыплят не менее чем у 80% привитых цыплят выше</p>	<p>на 2,0 lgЭИД50, чем в контроле</p>
<p>Антигенная активность через 28 сут. после иммунизации: титр антител к вирусу ИБК - индекс нейтрализации вируса ИБК со сборной сывороткой крови от вакцинированных цыплят не менее чем у 80% привитых цыплят в ИФА не ниже</p>	<p>2-х минимальных положительных значений</p>
<p>Антигенная активность через 28 сут. после иммунизации: титр антител к вирусу ССЯ-76 не менее чем у 80% привитых цыплят в РТГА, не ниже</p>	<p>5,0 log₂ (1:32)</p>
<p>Антигенная активность через 28 сут. после иммунизации: титр антител к вирусу ССЯ-76 не менее чем у 80% привитых цыплят в ИФА, не ниже</p>	<p>2-х минимальных положительных значений</p>
<p>Прирост антител у опытных цыплят при наличии до вакцинации антител к вирусам НБ, ИБК и ССЯ-76, через 28 сут. после прививки</p>	<p>2-х кратный и более</p>