



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

2012 г.

06 ИЮН 2012

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины против миксоматоза кроликов

культуральной из штамма «В-82» сухой

(Организация-разработчик: ОАО «Покровский завод биопрепаратов»)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое название - Вакцина против миксоматоза кроликов культуральная из штамма «В-82» сухая.

Международное непатентованное название - Вакцина против миксоматоза кроликов культуральная из штамма «В-82» сухая.

2. Лекарственная форма – лиофилизированная масса. Вакцина изготовлена из вакцинного вируса миксоматоза кроликов, (штамм «В-82»), репродуцированного в культуре клеток почек крольчат или в культуре клеток куриных эмбрионов, с добавлением в качестве стабилизатора 6% пептона и 5% лактозы (в соотношении 50:50).

По внешнему виду вакцина представляет собой сухую однородную пористую массу белого цвета с желтым оттенком.

Вакцина расфасована по 10-50 прививных доз  $3,0-5,0 \text{ см}^3$  во флаконы соответствующей вместимости. Флаконы заполнены инертным газом или стерильным осушенным воздухом, герметично укупорены резиновыми пробками, укреплены алюминиевыми колпачками.

3. Флаконы с вакциной упакованы в коробки с наличием гнёзд или перегородок, обеспечивающих их неподвижность и целостность. В каждую коробку с вакциной вкладывают инструкцию по ее применению.

Коробки с вакциной упакованы в ящики из гофрокартона.

Срок годности вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.

4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом темном месте при температуре от 2 до  $8^{\circ}\text{C}$ .

5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом



и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки вакцины, не использованные в течение 4 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут или обработки 2% раствором щелочи или 5% раствором хлорамина (1:1) в течение 30 минут.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

## **II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у кроликов к возбудителю миксоматоза кроликов на 9 сутки после однократной вакцинации, который сохраняется не менее 9 месяцев.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится 500-1000 ИД<sub>50</sub>/см<sup>3</sup> вируса миксомы кроликов.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

## **III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

8. Вакцина предназначена для профилактики миксоматоза кроликов в благополучных, угрожаемых и неблагополучных пунктах в комплексе с общими противоэпизоотическими мерами.

9. Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных.

10. Вакцинации подлежат клинически здоровые кролики с 28-суточного возраста. Крольчих вакцинируют в любой период беременности. Кроликов, иммунизируемых впервые, через 3 месяца ревакцинируют.

Для внутримышечного введения вакцину ресуспензируют, соблюдая правила асептики и антисептики, из расчета 1 см<sup>3</sup> физиологического раствора или воды для инъекций на 1 дозу вакцины. Вакцину вводят внутримышечно в область внутренней поверхности бедра в объеме 1 см<sup>3</sup>.

Поверхность кожи в месте введения вакцины обрабатывают 70% спиртом. Шприцы и иглы перед применением стерилизуют кипячением в течение 20 минут.

11. Симптомов проявления миксоматоза или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.

12. В течении 1-2 суток после прививки у кроликов допускается снижение аппетита.

13. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики против миксоматоза кроликов. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений или осложнений, как правило, не отмечается.



15. Запрещается использовать вакцину против миксоматоза кроликов одновременно с другими иммунобиологическими препаратами, кроме вакцины против вирусной геморрагической болезни кроликов жидкой инактивированной.

16. Мясо, полученное от вакцинированных кроликов, реализуют без ограничений.

#### **IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

17. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

18. Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть в спецодежде (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа, респираторы). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды. В случае разлива вакцины, зараженный участок пола или почвы заливают 5% раствором хлорамина или 2% раствора едкого натрия. При случайном введении препарата человеку, место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

20. Организация-производитель: ОАО «Покровский завод биопрепаратов» (601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, тел/факс 8 (49243) 7-11-10).

Адрес места производства лекарственного средства: (601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, тел/факс 8 (49243) 7-11-10).

Инструкция по применению вакцины против миксоматоза кроликов культуральной из штамма «В-82» сухой разработана ОАО «Покровский завод биопрепаратов» (601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, тел/факс 8 (49243) 7-11-10).

С утверждением настоящей Инструкции отменяется Инструкция по применению вакцины против миксоматоза кроликов культуральной из штамма «В-82» сухой, утвержденная Россельхознадзором 30 июня 2006 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».